

Lógica Computacional 1 — Turma A

Primeira Prova (**Gabarito**)

Indução e Cálculo Proposicional

Prof. Mauricio Ayala-Rincón

Departamento de Ciência da Computação, Instituto de Ciências Exatas
Universidade de Brasília

3 de Dezembro de 2012

Duração: 110 min

Início: 16:00h - Término: 17:50h

Nome:

Matrícula:

1. (2 pontos) Prove por indução estrutural que fórmulas bem formadas da lógica proposicional são balanceadas no sentido de ter igual número de parêntesis esquerdos e direitos.

Solução.

(BI) As constantes \perp e \top assim como variáveis em V , tem zero parêntesis. Assim, todas as fórmulas básicas são balanceadas.

(PI) Caso $\varphi = (\neg\psi)$. Por hipótese de indução ψ tem igual número de “(” que de “)”, conseqüentemente o balanceamento vale para a fórmula $(\neg\psi)$ na qual um parêntesis á esquerda e um a direita é adicionado.

Casos $\varphi = (\psi\Box\phi)$, onde $\Box \in \{\wedge, \vee, \rightarrow\}$. Por hipótese de indução, tanto ψ quanto ϕ tem igual número de “(” que de “)”, conseqüentemente o balanceamento vale para a fórmula $(\psi\Box\phi)$ na qual um parêntesis á esquerda e um a direita é adicionado..

2. (8 pontos) O sistema de dedução natural para o cálculo proposicional clássico é dado na Tabela 1. O cálculo para a lógica intuicionista troca a regra (PBC) pela regra de eliminação do absurdo sem possibilidade de descarga de suposições:

$$\frac{[\neg\varphi]^u \quad \vdots \quad \perp}{\varphi} \text{ (PBC) } u \quad \rightsquigarrow \quad \frac{\perp}{\varphi} (\perp_e)$$

Tabela 1: REGRAS DE DEDUÇÃO NATURAL PARA A LÓGICA PROPOSICIONAL CLÁSSICA

introdução	eliminação
$\frac{\varphi \quad \psi}{\varphi \wedge \psi} (\wedge_i)$	$\frac{\varphi \wedge \psi}{\varphi} (\wedge_e)$
$\frac{\varphi}{\varphi \vee \psi} (\vee_i)$	$\frac{\varphi \vee \psi \quad \begin{array}{c} [\varphi]^u \quad [\psi]^v \\ \vdots \quad \quad \quad \vdots \\ \chi \quad \quad \quad \chi \end{array}}{\chi} (\vee_e) u, v$
$\frac{[\varphi]^u \quad \vdots \quad \psi}{\varphi \rightarrow \psi} (\rightarrow_i) u$	$\frac{\varphi \quad \varphi \rightarrow \psi}{\psi} (\rightarrow_e)$
$\frac{[\varphi]^u \quad \vdots \quad \perp}{\neg\varphi} (\neg_i) u$	$\frac{\varphi \quad \neg\varphi}{\perp} (\neg_e)$
	$\frac{[\neg\varphi]^u \quad \vdots \quad \perp}{\varphi} \text{ (PBC) } u$

- (a) (2 pontos) Apresente uma derivação no cálculo clássico de $(\neg\psi \rightarrow \phi) \vdash (\neg\phi \rightarrow \psi)$
 (b) (2 pontos) Apresente uma derivação no cálculo indutivo de $(\psi \rightarrow \neg\phi) \vdash (\phi \rightarrow \neg\psi)$
 (c) (1 ponto) Utilizando a regra derivada do item 2a,

$$\frac{(\neg\psi \rightarrow \phi)}{(\neg\phi \rightarrow \psi)} \text{ (CP}_3\text{)}$$

apresente uma derivação para $\neg\neg\varphi \vdash \varphi$.

Nota: sempre que a regra $(\neg\neg_e)$ não é intuicionista e a derivação utiliza somente regras intuicionistas, exceto pela aplicação de (CP_3) , pode-se concluir que esta versão de contraposição não é intuicionista.

Solução:

$(\neg\psi \rightarrow \phi) \vdash (\neg\phi \rightarrow \psi)$:

$$\frac{\frac{\frac{\neg\psi \rightarrow \phi}{\phi} \quad [\neg\psi]^y \quad (\rightarrow_e)}{\perp} \quad [\neg\phi]^x \quad (\neg_e)}{\psi} \quad (\text{PBC}) \quad y}{\neg\phi \rightarrow \psi} \quad (\rightarrow_i) \quad x$$

$(\psi \rightarrow \neg\phi) \vdash (\phi \rightarrow \neg\psi)$:

$$\frac{\frac{\frac{\psi \rightarrow \neg\phi}{\neg\phi} \quad [\psi]^y \quad (\rightarrow_e)}{\perp} \quad [\phi]^x \quad (\neg_e)}{\neg\psi} \quad (\neg_i) \quad y}{\phi \rightarrow \neg\psi} \quad (\rightarrow_i) \quad x$$

$\neg\neg\varphi \vdash \varphi$:

$$\frac{\frac{\frac{[\neg\varphi]^x}{\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi} \quad (\rightarrow_i) \quad x}{\neg\neg\varphi \rightarrow \neg\varphi} \quad (\text{CP}_3)}{\neg\neg\varphi \rightarrow \varphi} \quad (\rightarrow_e)}{\varphi} \quad (\rightarrow_e)$$

(d) (3 pontos) Apresente derivações para $\neg(\phi \vee \psi) \dashv\vdash (\neg\phi \wedge \neg\psi)$.

Nota: derivações no cálculo intuicionista são possíveis. No sentido "⊢" pode supor ϕ e ψ e junto com a premissa deduzir $\neg\phi$ e $\neg\psi$, respectivamente; no outro sentido, "⊣", ao supor $(\phi \vee \psi)$ pode-se deduzir o absurdo.

Solução:

From left to right, one has the derivation below.

$$\frac{\frac{\frac{(\neg_e) \quad \neg(\phi \vee \psi)}{\perp} \quad (\vee_i) \quad \frac{[\phi]^u}{\phi \vee \psi}}{\neg\phi} \quad (\neg_i) \quad u}{\neg\psi} \quad (\neg_e)}{\neg\phi \wedge \neg\psi} \quad (\wedge_i) \quad v$$

From right to left, one has the derivation below.

$$\begin{array}{c}
 \frac{(\phi \vee \psi) \quad (\wedge_e) \frac{(\neg\phi \wedge \neg\psi)}{\neg\phi} \quad [\phi]^x \quad \frac{(\neg\phi \wedge \neg\psi) \quad (\wedge_e) \quad [\psi]^y}{\neg\psi}}{\perp} \quad \frac{(\neg\phi \wedge \neg\psi) \quad (\wedge_e) \quad [\psi]^y}{\perp} \quad (\neg_e)}{\perp} \quad (\vee_e) \quad x, y \\
 \hline
 \neg(\phi \vee \psi) \quad (\neg_i) \quad u
 \end{array}$$